

Laboratorium för Klinisk patologi

Remitterande vårdenhet (HSA-ID)	Personnummer och namn
Provtagare (HSA-ID)	Provtagningsdatum
<input type="checkbox"/> SNABBSVAR <input type="checkbox"/> SVF Tfn	Plats för laboratoriets etikett

PROVTYP (ett alternativ) 254 <input type="checkbox"/> HPV-analys 256 <input type="checkbox"/> HPV-analys och cytologisk analys (dubbelanalys) 255 <input type="checkbox"/> HPV-analys med cytologisk analys om positiv för HPV (reflexcytologi)	INDIKATION FÖR PROVTAGNING (ett alternativ) 225 <input type="checkbox"/> Screening 48 <input type="checkbox"/> Symtom 49 <input type="checkbox"/> Kontroll/utredning av avvikande prov 51 <input type="checkbox"/> Peroperativ cervixdiagnostik 54 <input type="checkbox"/> HPV-analys med cytologisk analys om positiv för HPV
TOPOGRAFI (ett eller flera alternativ) 212 <input type="checkbox"/> Fullständigt prov (2 portioner) 252 <input type="checkbox"/> Portio 213 <input type="checkbox"/> Vagina 218 <input type="checkbox"/> Endocervix 219 <input type="checkbox"/> Annat	Uppföljning efter dysplasibehandling 52 <input type="checkbox"/> < 2 år efter behandling 53 <input type="checkbox"/> ≥ 2 år efter behandling
ANAMNES 201 <input type="checkbox"/> Senaste mens (mdd) 202 <input type="checkbox"/> Gravid (vecka) 203 <input type="checkbox"/> Partus (åmmdd) 220 <input type="checkbox"/> Pågående cytostatikabehandling 57 <input type="checkbox"/> Tidigare strålbehandlad 221 <input type="checkbox"/> Tidigare total hysterektomi 204 <input type="checkbox"/> Menopaus 205 <input type="checkbox"/> Hormonbehandling i/efter klimakteriet 246 <input type="checkbox"/> Blödningsrubbnig 247 <input type="checkbox"/> Kontaktblödning 248 <input type="checkbox"/> Mellanblödning 249 <input type="checkbox"/> Postmenopausal blödning	STATUS 59 <input type="checkbox"/> Blödning 207 <input type="checkbox"/> Spiral Kolposkopiutfall: 28 <input type="checkbox"/> Ej utförd 29 <input type="checkbox"/> Normal 240 <input type="checkbox"/> Låggradig atypisk 241 <input type="checkbox"/> Höggradig atypisk 66 <input type="checkbox"/> Typ av TZ, 1-3 67 <input type="checkbox"/> Swede score, 0-10 p 224 <input type="checkbox"/> Cervicit/Avvikande flytning 64 <input type="checkbox"/> Atrofi
ÖVRIGT 216 <input type="checkbox"/> Px taget vid undersökningen	Ev. kommentar

Under rubriken Indikation ska alltid ett och endast **ett** alternativ markeras med kryss.
Under rubrikerna Topografi, Anamnes och Status ska **ett eller flera** alternativ markeras.

Screening	Prov tas från symtomfri patient som inte ingår i särskilt uppföljningsprogram på gynnottagning. Bör endast tas som s.k. kompletterande screening
Symtom	Prov tas från patient p.g.a. symtom eller makroskopiska fynd (som specificeras under rubrikerna Anamnes och Status på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer
Kontroll/utredning av atypi	Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) inte har föranlett behandling
Uppföljning av obedömbart prov	Nytt prov tas därför att föregående prov inte hade tillfredsställande bedömbarhet vid laboratoriet
Peroperativ cervixdiagnostik	Cytologiskt prov tas för diagnostik av ev. kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasi behandling. Ersätter därmed cervixabrasio
Senaste mens	Senaste menstruationens första dag
Gravid vecka	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor
Partus	Ifylls om patienten har fött barn senaste året
Menopaus	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern
Hormonbehandling	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar inte hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista
Blödningsrubbnig	Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (t.ex. graviditet)
Blödning	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen vid undersökningen
Avvikande flytning	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det som är normalt för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.)
Atrofi	Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk
Typ av TZ	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se nationellt vårdprogram.
Låggradigt/höggradigt atypiskt	Kolposkopi motsvarar LSIL, resp. HSIL
Swedescore	Scoringsystem för kolposkopi, 0 – 10 p. Se nationellt vårdprogram.